

Να κρατηθεί σε αρχείο

: 210-77.93.777

, 29/03/2017

: 2610-224629 , e: pkax-gp@otenet.gr

(μ) μ

Εγγυημένη Σύνοψη	Γλοιστόριο	Καρκίνωση	Κυκλοκόνιο	Σηψιρριζίες	Δράση	Χημική Ομάδα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
					Προληπτική, Θεραπευτική				
Copper oxide Ανόργανα άλατα χαλκού			•		Π	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή υποξειδίου του χαλκού	2	21	
Bordeaux mixture Ανόργανα άλατα χαλκού	•	•	•		Π	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή βορδιγάλειου πολτού	2	21	
Copper hydroxide Ανόργανα άλατα χαλκού	•	•	•		Π	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού	2	21	
Copper oxychloride Ανόργανα άλατα χαλκού	•	•	•		Π	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού	2	21	
Tribasic copper sulfate Ανόργανα άλατα χαλκού	•	•	•		Π	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή τριβασικού θειϊκού χαλκού	2	21	
Difenoconazole (ντιφεκοναζόλ)			•		Π, Θ	Τριαζόλες	2 / 14	30	
Dodine (ντοντίν)	•		•		Π, Θ	Γουανιδίνες	2 / 7	15	
Mancozeb (μανκοζέμπ)			•		Π	Διθειοκαρβαμιδικά	1	21	<u>ΕΚΤΟΣ</u> των ποικιλιών «Καλαμών» και «Κορωνέικη»
Kresoxim methyl (κρεσοξιμ-μεθύλ)			•		Π, Θ	Στρομπιλουρίνες	2 (βρώσιμη) 3 (ελαιοποίηση)	**	** Τελευταία επέμβαση: - Βρώσιμες ποικιλίες: Πριν την άνθηση - Ελαιοποιησιμες ποικιλίες : 30 ημέρες
Trifloxystrobin (τριφλοξιστρομπίν)			•		Π, Θ	Ομάδα δρώντος QoIs	2	14	Φθινόπωρο: <u>μόνο</u> μία εφαρμογή
Tebuconazole (τεμπουκοναζόλ)			•		Π, Θ	Τριαζόλες	1	Δ.Ε.	

Εγγυημένη Σύμβαση	Γλοιοσπόριο	Καρκίνωση	Κυκλοκόνιο	Σηψιρριζίες	Δράση	Χημική Ομάδα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
					Προληπτική, Θεραπευτική				
Tebuconazole + Trifloxystrobin			•		Π, Θ	Συνθετικό παράγωγο φυσικών στρομπιλουριών	1	Δ.Ε.	Προληπτική εφαρμογή - από την έναρξη της βλάστησης μέχρι την άνθηση
Trichoderma (τριχοδερμα)				•	Π	Σκεύασμα με βάση από επιλεγμένα στελέχη μυκήτων με ανταγωνιστική δράση σε εδαφογενείς φυτοπαθολόγους μύκητες εδάφους	2	3	Ειδικότερη εφαρμογή : • <u>Πριν και κατά τη μεταφύτευση</u> • <u>Σε εγκατεστημένες φυτείες</u>
Pyraclostrobin (πυρακλοστρομπίν)	•		•		Π, Θ	Στρομπιλουρίνες (μεθόξυ-καρβαμιδικά)	3 / 21	28	• <u>Μόνο</u> σε ελαιοποιήσιμες ποικιλίες • <u>Άνοιξη</u> : 1-2 εφαρμογές, μέχρι το 10% του τελικού μεγέθους καρπών. • <u>Φθινόπωρο</u> : μόνο μία εφαρμογή

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (Καν. 1107/2009 ΕΕ).

Για την προστασία του χρήστη, του καταναλωτή και του Περιβάλλοντος: Διαβάστε σχολαστικά τις ετικέτες στις συσκευασίες των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ).

Τηρείτε πιστά και εφαρμόζετε με σύνεση τα ΦΠ, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες χρήσης και τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Συνδυαστική χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων, περιορίζει τις προσβολές και μειώνει τον αριθμό των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες. Εφαρμόζετε εναλλαγή μεταξύ των ΦΠ (διαφορετικές χημικές ομάδες) όπου αυτό είναι δυνατό, με σκοπό την αποφυγή στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Διαχειριστείτε τις κενές συσκευασίες με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Για νέες εγκρίσεις, τροποποιήσεις ή ανακλήσεις ΦΠ, μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (<http://1click.minagric.gr:8080/oneClickUI/frmFytoPro.zul>).