



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**  
**ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ**  
Πανεπιστημίου 334, 264 43 ΠΑΤΡΑ  
Τηλ.: 2610.224.629, Fax: 2610.623.238  
Email: [pkpfpatr@otenet.gr](mailto:pkpfpatr@otenet.gr)

Πληροφορίες:  
**Πέττας Ν., Γεωπόνος MBA, MSC**

*Δελτίο*  
*Γεωργικών Προειδοποιήσεων*  
*Φυτοπροστασίας*

**ΜΗΛΟΕΙΔΗ**  
**Νº 2 / 19-05-2016**

*Για τις περιοχές:*  
**ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,**  
**ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,**  
**ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ.**

#### **ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ (Ορεινές περιοχές)**

Ξεκίνησε η 1<sup>η</sup> πτήση του εντόμου στις 10 Μαΐου.

Η έναρξη των εκκολάψεων αναμένεται στις 04 Ιουνίου. Το 50% και 90% των εκκολάψεων αναμένονται στις 19 Ιουνίου και στις 02 Ιουλίου, αντίστοιχα. Σημειώνουμε, ότι το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του.

#### **ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ**

Εάν πρόκειται να εφαρμοστεί ή μέθοδος της παρεμπόδισης της σύζευξης, να γίνει άμεση τοποθέτηση διαχυτήρων φερομόνης (σε οπωρώνες τουλάχιστον 10 στρεμμάτων).

**Η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών με στόχο τα αυγά ή/και τις προνύμφες της καρπόκαψας ως εξής:**

- Η 1<sup>η</sup> εφαρμογή να γίνει από 28 Μαΐου έως 3 Ιουνίου, με ρυθμιστές ανάπτυξης ή άλλα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται στην ωοαπόθεση:

**ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΧΛΟΡΑΝΘΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ, ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ,**  
**ΧΛΟΡΑΝΘΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ (+ ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ), ΙΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΚΚΙΩΣΕΩΝ.**

Εναλλακτικά,

- Η 1<sup>η</sup> εφαρμογή μπορεί να γίνει από 4 έως 10 Ιουνίου, με οργανοφωσφορικά ή συνθετικά πυρεθρινοειδή ή ρυθμιστές ανάπτυξης και λοιπά νεότερα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται από την έναρξη των εκκολάψεων:

**ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ, ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ (Μηλιά),**  
**ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΩΣ, ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΦΟΣΜΕΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ,**  
**Β ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ, ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ, ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΞ (Μηλιά), ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ,**  
**ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ, ΘΕΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ, ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ.**

Η επανάληψη του ψεκασμού, σε 7, 14 ή 21 ημέρες, εξαρτάται από την υπολειμματική διάρκεια του εντομοκτόνου, την ένταση της τρέχουσας προσβολής και το ιστορικό του μηλεώνα. Σε περίπτωση επανάληψης του ψεκασμού να προτιμηθεί εντομοκτόνο από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας. Προκειμένου να προστατευθούν τα ωφέλιμα, συστήνεται τα πυρεθρινοειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 φορά. Βλέπε επίσης την λίστα με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα & ακαρεοκτόνα, έκδοση 27/04/2015.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει επίσης στην αντιμετώπιση των ακάρεων. Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών όπως φυλλορύκτες, αφίδες η κοκκοειδή καθώς και για τον τετράνυχο να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

#### **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ**

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ**  
**ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC**

Όλα τα δελτία αναρτώνται στον ηλεκτρονικό κόμβο του Υπουργείου [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)  
Παραλαβή των δελτίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με απλό αίτημα στο [pkpfpatr@otenet.gr](mailto:pkpfpatr@otenet.gr)