

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Πληρ.: Δρ. Γεωργιος Χρ. Λυκοκανέλλος
Τηλ.: 2610-271.959 (80261)
E-mail: glykokanellos@minagric.gr

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

Εγγυημένη Σύμβαση	ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ	ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ	ΚΑΠΝΙΑ	ΣΗΨΕΙΣ			ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	Χημική Ομάδα	Δράση Π= Προληπτική, Θ= Θεραπευτική	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
				ΚΑΡΠΩΝ	ΛΑΙΜΟΥ - ΡΙΖΩΝ							
					ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ	ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ						
Copper oxide		•	•	•			•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή υποξειδίου του χαλκού	Π	3	21	
Bordeaux mixture	•		•				•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή βορδιγάλειου πολτού	Π	4	21	
Copper hydroxide	•	•	•	•			•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού	Π	3	21	
Copper oxychloride	•	•	•	•			•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού	Π	3	21	
Tribasic copper sulfate	•		•	•			•	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή τριβασικού θειϊκού χαλκού	Π	3	21	
2-phenylphenol				•				Φαινόλες	Π	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή: (μόνο Πορτοκάλια – Λεμόνια)
fosethyl				•	•			Φωσφονικών	Π, Θ	(3 ή 4)*	(3 ή 15)*	* Ανάλογα με την έγκριση του σκευάσματος ** Φυτώρια (Λεμ./Πορτ./Μαντ.)
prochloraz				•				Ιμιδαζολών	Π, Θ	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή
Bacillus amyloliquefaciens							•	---		1-6 / 5	0	

Εγγυημένη Σύμβαση	ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ	ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ	ΚΑΠΝΙΑ	ΣΗΨΕΙΣ			ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	Χημική Ομάδα	Δράση Π= Προληπτική, Θ= Θεραπευτική	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
				ΚΑΡΠΩΝ	ΛΑΙΜΟΥ – ΡΙΖΩΝ							
					ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ	ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ						
dimethomorph					•			Αμίδια του κινναμικού οξέος	Π, Θ	2 / 14	14	Μόνο σε Πορτοκάλια
thiabendazole				•				Βενζιμιδαζολικά	Π, Θ	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή
trichoderma gamsii						•		Με βάση από επιλεγμένα στελέχη μυκήτων με ανταγωνιστική δράση σε εδαφογενείς φυτοπαθογόνους μύκητες εδάφους	Π	2	3	Ειδικότερη εφαρμογή : • <u>Πριν και κατά τη μεταφύτευση</u> • <u>Σε εγκατεστημένες φυτείες</u> - <u>Δε συνδυάζεται (βλ. οδηγίες σκ.)</u>
fludioxonil				•				Φαινυλοπυρρόλων	Π	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή
pyraclostrobin				•	•			Στρομπιλουρίνες	Π, Θ	4 / 14	7	• <u>ΟΧΙ</u> σε Λεμόνια
mancozeb					•			Διθειοκαρβαμιδικά	Π	1	14	
imazalil				•				Ιμιδαζολών	Π, Θ	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή
Candida oleophila str. O				•				Μικροοργανισμός	Π, Θ	1	-	Μετασυλλεκτική εφαρμογή
Plants oils / Clove oil				•				(Σε συνδυασμό με άλλη Χ.Ο.)	Π, Θ	1	1	Μετασυλλεκτική εφαρμογή
Pyrimethanil				•				Ανιλινοπυριμιδινών	Π, Θ	1	1	Μετασυλλεκτική εφαρμογή * Προσοχή στην έγκριση /σκεύασμα

Σελ. 2 από 2

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ / ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (Καν. 1107/2009 ΕΕ)

Για την προστασία του Ανθρώπου και του Περιβάλλοντος: Διαβάζετε σχολαστικά τις ετικέτες στις συσκευασίες των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ). Τηρείτε πιστά και εφαρμόζετε με σύνεση τα ΦΠ, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες χρήσης και τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Συνδυαστική χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων, περιορίζει τις προσβολές και μειώνει τον αριθμό των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες. Εφαρμόζετε εναλλαγή μεταξύ των ΦΠ (διαφορετικές χημικές ομάδες) όπου αυτό είναι δυνατό, με σκοπό την αποφυγή στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Διαχειριστείτε τις κενές συσκευασίες με σεβασμό προς το περιβάλλον. Για νέες εγκρίσεις, τροποποιήσεις ή ανακλήσεις ΦΠ, μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (<https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>).

Η Προϊσταμένη

Ευαγγελία Σακκούλη
Γεωπόνος